



УТВЕРЖДАЮ

*Зам.* Председатель Комитета  
ветеринарного контроля  
и надзора МСХ РК



## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению  
лекарственного препарата Эндометрамаг - Био®

Организация-разработчик: АО «Мосагроген»  
117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-й, д.1, стр.1, пом.IV эт.1 ком 6.

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-3452-17

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата:

Эндометрамаг-Био® (Endometramag-Bio).

Международные непатентованные наименования действующих веществ:  
пропранолол, бензетония хлорид.

2. Лекарственная форма: раствор для внутриматочного введения.

Лекарственный препарат в 1 мл в качестве действующих веществ содержит пропранолола гидрохлорида – 15 мг, бензетония хлорида - 0,75 мг, а также вспомогательные вещества: пропиленгликоль, метилцеллюлозу, динатрия эдетат (Трилон Б) и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой слегка опалесцирующую жидкость зеленовато-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год с даты производства. Запрещается использование лекарственного препарата по истечении срока годности.



# МОСАГРОГЕН

ветеринарные препараты

4. Эндометрамаг-Био<sup>®</sup> выпускают расфасованным по 0,5 л и 1 л в полиэтиленовые канистры соответствующей вместимости, укупоренные резбовыми пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.
6. Эндометрамаг-Био<sup>®</sup> следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Эндометрамаг-Био<sup>®</sup> отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Эндометрамаг-Био<sup>®</sup> относится к антисептическим препаратам.
10. Пропранолол – действующее вещество Эндометрамага-Био<sup>®</sup> - усиливает сократительную способность миометрия матки, а бензетония хлорид оказывает бактерицидное действие в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов. Бензетоний активен в отношении дрожжей и ряда грибов, а также некоторых внеклеточно расположенных вирусов.
- Препарат не оказывает прижигающего действия на слизистую оболочку матки и способствует регенерации эндометрия.

В рекомендуемых дозах препарат хорошо переносится животными, не оказывает местнораздражающего действия, не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и гепатотоксическим действием.

Компоненты препарата плохо всасываются через слизистую оболочку матки, что предотвращает их накопление в продуктах животноводства и молоке.

Эндометрамаг-Био<sup>®</sup> по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Эндометрамаг-Био<sup>®</sup> применяют для лечения эндометрита у коров и профилактики послеродовых акушерских заболеваний.
12. Запрещается применение лекарственного препарата при повышенной чувствительности животного к компонентам препарата.
13. Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

Для лечения эндометрита препарат вводят внутриматочно в дозе 50-150 мл





с помощью шприца Жанэ с интервалом 24-48 часов до клинического выздоровления. Курс лечения составляет 3-5 введений. При лечении хронического и субклинического эндометритов до введения лекарственного препарата необходимо провести ректальный массаж матки в течение 1,5-2,0 минут.

Для профилактики послеродовых акушерских болезней препарат вводят однократно внутриматочно в дозе 50-150 мл с помощью шприца Жанэ после отделения последа, абортов или оказания помощи при осложненных и патологических родах.

14. Симптомы передозировки у коров не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Запрещено применение лекарственного препарата беременным животным.

Разрешено применение в период лактации.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют как можно скорее в той же дозировке и по той же схеме.

18. При применении Эндометрамага-Био® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и симптоматическую терапию.

19. Не допускается одновременное применение Эндометрамага-Био® с ксилазином, ксиланитом, рометаром, ромпуном.

20. Молоко можно использовать для пищевых целей без ограничений.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 2 суток после прекращения применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Эндометрамагом-Био® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом руки. Пустые канистры из-под лекарственного препарата запрещается



# МОСАГРОГЕН

ветеринарные препараты

использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Эндометрамаг-Био®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения

АО «Мосагроген»  
Российская Федерация, 117545,  
г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 1.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной владельцем или  
держателем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя

АО «Мосагроген»  
Российская Федерация, 117545,  
г. Москва, проезд Дорожный  
1-ый, д. 1, стр. 1, пом. IV, эт.1 ком 6.  
тел. 8 (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора  
АО «Мосагроген»



И.А. Казакова