

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР
Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР в качестве антисептического
и ранозаживляющего средства для животных
(организация-разработчик: ООО «БИОСТИМ», г. Бобров)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата:

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР (ANTISEPTIC-STIMULATOR D-2 fraction 15% solution).

Международное непатентованное наименование: отсутствует

Лекарственная форма: раствор для наружного, интравагинального и внутриматочного применения.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР содержит в 1 мл: аминокислоты – 0,4 мг, а также неорганические азотистые соединения, алифатические и циклические углеводороды, меркаптановые соединения и воду - до 1 мл.

Внешний вид: прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета со специфическим запахом.

Упаковка: по 10, 20, 50, 100, 200, 250 мл в полимерные или стеклянные флаконы, по 1 и 2,5 л в полимерные бутылки соответствующей вместимости, по 5 и 10 л в полимерные канистры соответствующей вместимости.

Стеклянные флаконы укупоривают резиновыми пробками и обкатывают алюминиевыми колпачками, бутылки и полимерные флаконы укупоривают навинчиваемыми пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия и снабжают инструкцией по применению. Флаконы по 10, 20, 50, 100, 200 и 250 мл упакованы в индивидуальные картонные коробки, в которые вложена инструкция по применению.

Предусмотрена фасовка лекарственного препарата по 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мл в пластиковые, алюминиевые и жестяные моноблочные баллоны с инертным газом под давлением (изобутан и азот до 5,8 бар) и в пластиковые баллоны с насадкой для распыления.

Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

Хранение: в герметичной упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в герметичной упаковке – 3 года со дня производства. Срок хранения лекарственного препарата после вскрытия флакона - не более 14 суток.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР следует хранить в недоступном для детей месте.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР относится к антисептическим и ранозаживляющим лекарственным препаратам наружного действия.

Фармакодинамика:

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР является разбавленной водорастворимой фракцией сухой перегонки тканей животного происхождения. Входящие в состав лекарственного препарата азотистые и аммонийные соединения (аминокислоты, производные алифатических аминов, карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды) стимулируют активность ретикуло-эндотелиальной системы, нормализуют трофические процессы, обладают противовоспалительным и антибактериальным действием, что уменьшает воспаление и ускоряет регенерацию поврежденных тканей.

По степени воздействия на организм АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

Показания к применению. АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР назначают при дерматитах, фолликулитах, стоматитах, баланопоститах, вульвовагинитах крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, для обработки ран и промывания полостей у крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, а также для профилактики и лечения воспалительных процессов матки после родовспоможения при осложненных и патологических родах, оперативного отделения последа, при острых послеродовых эндометритах у коров и свиноматок и при синдроме метрит-мастит-агалактии у свиноматок. АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 фракция в аэрозольных баллонах или в баллонах с насадкой для распыления с целью повышения вывода инкубационных яиц птиц и улучшения жизнеспособности молодняка птиц применяется для: обработки инкубационных яиц птиц после их сортировки и/или непосредственно перед закладкой в инкубатор после дезинфекции, а также при переводе на вывод.

Противопоказания: Запрещается применять лекарственный препарат животным при повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата.

Способ применения и дозы: АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР применяют животным наружно, интравагинально или внутриматочно.

Внутриматочно и интравагинально препарат вводят с помощью катетера для искусственного осеменения.

Коровам – 300 мл на голову.

Свиноматкам – 300 мл на голову.

Мелкому рогатому скоту 50-70 мл на голову.

С лечебной целью коровам, овцам и козам в течение 3-4 дней, свиноматкам в течение 2-3 дней, ежедневно с интервалом 24 часа.

Для профилактики послеродовых осложнений коровам однократно.

Для санации матки у свиней, с профилактической целью вводится однократно.

При лечении ран и поражений кожи - ежедневно 1-2 раза в день в течение 5-7 дней.

Распыление следует проводить в течение 1-3 секунд, всегда держа баллон вертикально. При необходимости к наконечнику следует прикрепить канюлю.

В зависимости от величины поражения количество раствора должно быть таким, чтобы можно было полностью смочить обрабатываемую поверхность.

При обработке кожи или слизистой оболочки с целью обеззараживания, а также на свежие раны АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР наносят однократно.

Препарат в виде аэрозоля наносится непосредственно на инкубационное яйцо с расстояния 15 - 20 см. с экспозицией 8 - 10 секунд на каждый лоток с яйцом.

- обработки молодняка птиц перед высадкой в клетки или на пол. Препарат в виде аэрозоля наносится непосредственно на птиц, с расстояния 15 - 20 см. с экспозицией 10 - 15 секунд. для каждого ящика с молодняком птиц.

Передозировка: Симптомы передозировки при применении препарата АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР в соответствии с инструкцией не выявлены.

Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене: не выявлено.

Действия при прерывании курса лечения: В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в предусмотренной дозировке и схеме применения.

Побочное действие: При применении препарата АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не установлено.

Лекарственное взаимодействие: Сведения о несовместимости лекарственного препарата с различными группами лекарственных средств отсутствуют.

Допуски в пищу людям после применения препарата: Мясо продуктивных животных, а также молоко дойных животных после применения препарата АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР используются в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики.

При применении животным препарата АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к препарату следует избегать прямого контакта с препаратом АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 ФРАКЦИЯ 15% РАСТВОР. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Не допускать нагревания баллона!

Организация-производитель: ООО «БИОСТИМ» Россия, 397705, Воронежская обл., Бобровский р-н, г. Бобров, станция Битюг, д. 5, оф. 1.

Адрес места производства: Россия, Воронежская обл., Бобровский р-н, юго-западная часть кадастрового квартала 36:02:5400027.

Владелец регистрационного удостоверения и организация, уполномоченная принимать претензии потребителей: ООО «БИОСТИМ», Россия, 397705, Воронежская обл., Бобровский р-н, г. Бобров, станция Битюг, д. 5, оф. 1.

Тел.: + 7 (906) 580-02-90, + 7 (906) 580-02-94, e-mail: biostim.bobrov@mail.ru

Номер регистрационного удостоверения: № РК-ВП-4-3139-16