

Инструкция

по применению ветеринарного препарата «Севак Флю Н9 К (вакцина против гриппа птиц инактивированная)»

Описание

SEVAC FLU H9 K содержит птичий грипп типа А, подтип H9N2 подтипа G1.

Вирус птичьего гриппа в инактивированной и концентрированной форме гомогенизируют в масляном адъюванте.

Порядок применения препарата

SEVAC FLU H9 K рекомендуется для профилактической вакцинации бройлеров и кур-несушек или родительского молодняка против подтипа H9N2 птичьего гриппа типа А.

Дозировка

SEVAC FLU H9 K следует вводить подкожно или внутримышечно:

Бройлерам:

- вакцинация с однодневного возраста.
- несушки или производители: вакцинация с однодневного возраста;
- во время выращивания кур-несушек рекомендуются две ревакцинации, последняя вакцинация проводится за 4-2 недели до начала яйцекладки.

В соответствии с эпидемиологической обстановкой может быть осуществлена четвертая вакцинация в период яйцекладки.

Дозировка:

- Молодой цыпленок: 0,2 мл/гол.

Начиная с 2-недельного возраста: 0,5 мл на птицу.

Хранение

Хранить вакцину при температуре от +2°C до +8°C.

Защищать от света.

Не замораживать.

Упаковка

Флаконы 500 мл:

Бройлеры в дозе 0,2 мл / 2500 доз/флакон.

Несушки или кур -производители в дозе 0,5 мл/1000 доз/бутылка.