

Утверждена
приказом министра
сельского хозяйства
Республики Казахстан
от «12 » июня 2014 года

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата «Ингафлор 10% пероральный порошок»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Ингафлор 10% пероральный порошок (INGAFLOR 10% ORAL POWDER)

1.2. Ингафлор 10% пероральный порошок - антибактериальное лекарственное средство для перорального применения, содержащее в качестве действующего вещества флорфеникол 100 г, и два вспомогательных вещества тиксозил 1,0 г. и декстроза моногидрат до 1000 г.

1.3. По внешнему виду препарат представляет собой белый или почти белый кристаллический порошок без запаха, для включение в корма для животных.

1.4. Препарат выпускают расфасованным в многослойные полиэтиленовые мешки по 1 кг и по 10 кг.

1.5. Хранят лекарственное средство с предосторожностью (список Б), в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре не ниже + 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

1.6. Срок хранения ветеринарного лекарственного средства, в заводской упаковке: 2 года.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Ингафлор 10% пероральный порошок содержит действующее вещество: флорфеникол. Препарат используется в ветеринарии в качестве антибактериального средства. Эффективен при лечении инфекций вызванных грамположительными и грамотрицательными бактериями. Обладает широким спектром антибактериального действия, в том числе в отношении *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus parasuis*(возбудитель болезни Глессера), *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus suis* и *Escherichia coli*. Используется для лечения инфекций свиней, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами, а также некоторых видов анаэробных микроорганизмов; и у рыб для лечения фурункулеза(язвенная болезнь), а также иерсиниоза.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1. Целевые животные: Свиньи. Показания к применению: пневмония, энтерит и чувствительные у препаратау микроорганизмы.

3.2. Способ применения и дозировка: свиньям 10 мг/кг массы тела/сут в течение 5 дней подряд с кормом. Для лечения у свиней энзоотической пневмонии: Ингафлор 10% пероральный порошок нужно добавлять в корм добавить 10 мг флорфеникола на кг массы тела ежедневно. Доза составляет 200-400 мг/кг флорфеникола в корме - эквивалент 2 до 4 кг. Ингафлор 10% пероральный порошок на тонну корма, вводят в течение 5 последовательных дней.

3.3. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

3.4. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях у свиней наблюдается снижение потребления корма, диарея, незначительное снижение потребления воды животными, в течение лечения могут наблюдаться темно-коричневые фекалии и запор. Часто наблюдаемыми побочными эффектами являются диарея и / или перианальная и ректальная эритемы.

3.5. Противопоказанием к применению препарата является применение его не целевым видам животных, за исключением особых обстоятельств. Этот препарат не следует использовать при аллергии или токсической реакции на флорфеникол в прошлом. Не рекомендуется применять для лечения свиней из маточного стада.

3.6. Период выведения препарата у свиней составляет 15 дней.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

4.2. Во время работы с препаратом запрещено курить, пить и есть. Рекомендации по мерам предосторожности для персонала, работающего с флорфениколом, включают требование, избегать прямого контакта с глазами, кожей и одеждой. В случае случайного попадания в глаза, промыть большим количеством воды в течение 15 минут, а при попадании на кожу, смыть с мылом и водой. Снять одежду, на которую попал препарат и обратиться к врачу, если раздражение не проходит. Осторожно удалить остатки с рабочих поверхностей.

4.3. Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей. Пустые флаконы помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории, которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

6.1. Юнайтед фарма, Венгрия

Инструкция по применению препарата «Ингафлор 10% пероральный порошок» подготовлена заявителем ООО «Инга Фарм», 236016 г. Калининград, ул. Гражданская, д.28, к.11)

