

Рассмотрена и одобрена
на заседании Ветбиофармсовета
«17» декабря 2008 г., протокол № 44

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата МАСТИСЕПТ в ветеринарии

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- 1.1. Мастисепт (Mastiseptum).
- 1.2. Мастисепт представляет собой густую однородную мазеобразную массу лазурного цвета и стойким специфическим запахом камфары.
- 1.3. В 1,0 г которой содержится 0,05г камфоры, 0,02 г - метилсалицилата и основы до 1,0 г.
- 1.4. Препарат выпускают расфасованным в пластиковые емкости по 0,450; 1,0; 25,0 и 200,0 кг.
- 1.5. Препарат хранят в заводской упаковке по списку Б, при температуре от +8 до +15°C в сухом, защищенном от света месте. Срок годности препарата 2 года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

- 2.1 Камфора - вещество из группы терпенов. Относится к малотоксичным летучим веществам. Благодаря способности растворять липиды, хорошо всасывается и оказывает локальное антисептическое и раздражающее действие, вызывая гиперемии тканей со стойким согревающим эффектом, что способствует активации фагоцитоза. Уже при 20% перекутанной резорбции, достигается активное проникновение ее с проявлениями сосудорасширяющих свойств как поверхностно, так и более глубоко лежащих тканях. А.2.2. Выделение камфоры из организма происходит путем ее диффузии в кровь региональных микрокапилляров. С выдыхаемым воздухом камфора выделяется в течение 2-3 суток.
- 2.3. Метилсалицилат - является метиловым эфиром салициловой кислоты, относится к ненаркотическим анальгетикам, является малотоксичным веществом. При местном действии, быстро проникает в глубокие слои кожи, абсорбируется, гидролизуется до аниона салициловой кислоты. Выделяется с мочой. Оказывает согревающее, противовоспалительное, анальгезирующее.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА.

- 3.1 Препарат применяют для лечения и профилактики маститов, абсцессов, острых и хронических артритов, бурситов, тендинитов, суставного и мышечного ревматизма, остеохондроза, люмбаго, лимфаденита, ушибов.
- 3.2 Мастисепт наносят ежедневно (2-3 раза в сутки), толстым слоем на кожные покровы в зоне патологического процесса с последующим интенсивным ее втиранием. При маститах производят массаж вымени. Продолжительность лечения в среднем составляет 3-4 дня.
- 3.3 При применении мази побочных действий не отмечается, и не требует использования персоналом каких-либо защитных средств.
- 3.4. Вследствие раздражающего действия, не следует наносить препарат открытые раны, эрозивные поверхности и слизистые оболочки.
- 3.5. Мясо и молоко от леченных животных разрешается использовать в пищу людям не ранее трех суток после последнего применения препарата. До окончания этого срока молоко и мясо можно использовать на корм плотоядным.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

- 4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ.

5.1 В случае возникновения осложнений после применения Мастисепт его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» высылают невскрытую упаковку препарата данной серии с подробным описанием осложнений.

6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

6.1. «ImmCont» GmbH, Германия

